



C. Breedijk, J. van Duijnhoven,
C. Pellikaan, W. Op de Beeck
Energieweg 32
2964 LE, Groot Ammers
Tel. 0184-601558

DRACHTIGE TEEF

Uw hond is bij de reu geweest en waarschijnlijk drachtig. Wellicht is het raadzaam u enige aanwijzingen en raadgevingen mee te geven om een zo ongestoord mogelijk verloop van de dracht en partus te verkrijgen.

Vaststellen dracht

Het is zeker bij grote honden niet makkelijk om vast te stellen of uw hond inderdaad drachtig is. Er bestaat geen betrouwbare urine- of bloedtest voor honden op dit gebied dit in tegenstelling tot de situatie bij de mens. Het beste is dracht vast te stellen tussen de 28-32e dag na het dekken een echo te laten maken bij de dierenarts. Na de 45e dag van de dracht kan ook een röntgenfoto gemaakt worden om het aantal pups te tellen. Dit is niet altijd mogelijk bij grote hondenrassen.

Drachtduur en voeding

De bevalling vindt plaats tussen de 56e en 67e dag. De draagtijd is gemiddeld 63 dagen. Hoe groter het nest, hoe korter de dracht meestal duurt, en omgekeerd geldt dit ook. Het is niet nodig om de teef extra te voeren in de eerste 5 weken van de dracht. Het kan zelfs voorkomen dat de teef rond de 28-30e dag van de dracht enige dagen weinig eet. Het is belangrijk dat de teef goed uitgebalanceerd voer krijgt, bijvoorbeeld een compleet hondenvoer van een gerenommeerd merk. Na de 35e dag is het wel nodig de teef extra te gaan voeren. Het is dan verstandig langzaam over te stappen op een voeding die meer eiwitten bevat. Ze mag dan 10-15% meer voer per week erbij krijgen tot aan de partus.

Verschijnselen van de naderende partus

Ruim voor de partus zal u waarschijnlijk al zijn opgevallen dat de buikomvang van de teef ruim is toegenomen. De melkklieren beginnen wat op te zetten. Dit kan ook gebeuren bij niet drachtige teven, rond hetzelfde tijdstip. We spreken dan van schijndracht. Enige tijd voor de partus zakt de temperatuur van teef beneden de normale waarden voor een hond (38,0-39,0°C). Deze periode kan enige dagen duren. Vlak voor de partus zakt de temp. zelfs vaak tot 36,5°C.

Soms valt het op dat de teef helder, taai, soms iets melkachtig wit slijm verliest. Dit is het teken dat de ontsluiting en de partus binnen 24 uur zal plaatsvinden.

De partus

Binnen enkele uren nadat het eerste vruchtwater is afgekomen, moet de eerste pup geboren zijn. Het vruchtwater kan overigens wat groen van kleur zijn, dan moet de eerste

pup binnen een uur geboren zijn. Zo niet, dan dient u de dierenarts te waarschuwen. Tevens dient dit te geschieden indien de teef duidelijk zit te persen op een pup en dit langer dan 20 minuten duurt. Bij twijfel altijd de dierenarts bellen! De gemiddelde tijd tussen de geboorte van 2 pups is ongeveer 45 minuten. Er is nog geen reden tot bezorgdheid als deze tijd oploopt tot één tot twee uur, maar de teef mag dan niet persen.

Na de partus

De navelstreng scheurt meestal spontaan op de goede plaats af. Mocht een navelstreng toch bloeden, dan kunt u deze afbinden met een stevige garendraad ontsmet met wat betadine. Als de teef na de partus onrustig blijft, dan kunt u het beste laten controleren of zij inderdaad 'leeg' is. Indien nodig geeft de dierenarts haar dan een baarmoedercontraherend middel om eventueel achtergebleven nageboortes of pups alsnog af te laten komen.

De pups moeten gewogen worden op een nauwkeurige (digitale) weegschaal. Dit dient dagelijks te gebeuren en de gewichten van de pups moeten genoteerd worden. De eerste dag kunnen de pups gewicht verliezen (5-10%), daarna zullen ze dagelijks moeten groeien.

De teef

Voor zover de teef nog geen ontworming heeft gehad, geeft u deze nu. Daarna kan ze met de pups mee ontwormd worden.

Na de partus gaat de moeder steeds meer melk maken, dit gaat door tot de 3e of 4e week. Ze eet dan soms wel vier keer meer dan normaal! Extra vitamines of mineralen hoeft u niet te geven als ze hondenvoer eet wat kwalitatief goed en compleet is. Zorg ook altijd voor voldoende vers drinkwater. De teef mag geen troebele of stinkende uitvloeiing krijgen. De uitvloeiing is gedurende 3 dagen roodbruin en tot de 10e dag mag deze uitvloeiing, indien helder slijmig, aanwezig zijn.

De pups

Deze dienen vanaf de geboorte dagelijks te groeien. Op 10 dagen na de geboorte gaan de oogjes open en hebben de pups normaliter hun geboortegewicht verdubbeld.

Ontworming

De pups dienen voor het eerst ontwormd te worden op de leeftijd van 2 weken. Daarna de 4e, 6e, 8e, 10e en 12e week herhalen en vervolgens om de maand totdat de pups een half jaar oud zijn.

Inentingen

De eerste puppy-enting dienen de pups te krijgen als ze 6 weken oud zijn. Dit is tevens het tijdstip om de pups te chippen. De weil-parvo enting volgt als ze 9 weken oud zijn en de definitieve (cocktail)enting volgt op de leeftijd van 3 maanden.