



C. Breedijk, J. van Duijnhoven,
C. Pellikaan, W. Op de Beeck
Energieweg 32
2964 LE, Groot Ammers
Tel. 0184-601558

STERILISATIE VAN HET VROUWTJESKONIJN

Castratie (sterilisatie) van het vrouwtjeskonijn

Redenen voor castratie:

- Een dominant konijn dat agressief is naar een ander konijn of eigenaar
- Een konijn dat gaat sproeien in huis
- Uw konijn mag geen kleine konijntjes krijgen
- Het dier is zes maanden oud en om de kans op baarmoederkanker en/of ontsteking weg te nemen wordt ze gecastreerd

Bij het vrouwtjeskonijn, ook wel voedster genoemd, zijn er meer redenen om haar te laten helpen. Als een voedster namelijk niet gesteriliseerd wordt op een leeftijd van zes maanden dan is de kans groot dat ze vroeg of laat baarmoederkanker krijgt, cysten aan de eierstokken of een baarmoederontsteking.

Als je de voedster ieder jaar een nestje laat krijgen heb je dit probleem niet zo vaak, omdat zo de hormonale huishouding voor het dier 'normaal' blijft. Dat sluit niet uit dat ze geen baarmoederontsteking kunnen krijgen of problemen met de ongeboren jongen. Het beste is dan ook uiteraard als je niet wilt fokken met de voedster, deze op jonge leeftijd te laten castreren.

Welke leeftijd?

Vrouwtjes kunnen gecastreerd worden op het moment dat ze geslachtsrijp zijn en dat is op de leeftijd van vier maanden. We wachten liever tot ze zes maanden oud zijn, omdat de ingreep best heftig is en ze dan wat meer uitgegroeid zijn en daardoor wat sterker. Oudere dieren kunnen nog gecastreerd worden, maar na de leeftijd van zes jaar is het narcoserisico wel groter dan wanneer ze jonger zijn.

Vorbereiding thuis

Het is belangrijk dat u, voordat u belt om een afspraak te maken voor de castratie, uw konijn eerst goed nakijkt en op de volgende dingen let.

Heeft hij mooie ronde keutels, een schoon neusje, schone oogjes, eet hij goed, plakt er geen ontlasting aan zijn kontje? Is dit niet allemaal in orde, dan kan dat erop wijzen dat uw konijn ziek is en dat levert een extra narcoserisico op. Dan is het verstandig eerst een afspraak te maken voor een gehele gezondheidscheck.

Een veel voorkomend misverstand is dat het konijn vóór de operatie niet zou mogen eten. Dit is niet juist! Ze moeten juist eten voor de operatie. De redenen daarvoor zijn, ten eerste dat konijnen niet kunnen braken en ten tweede blijft zo hun maag-darmstelsel op gang. Iets wat van levensbelang is voor konijnen. Gewoon lekker laten eten dus.

Breng hun voeding en hooi mee naar de praktijk als u het konijn brengt voor de operatie.

U moet de kooi waar uw konijn bij thuiskomst weer ingaat, goed schoonmaken en er geen stro in leggen. Een plukje hooi, water een etensbak en als bodembedekking een handdoek.



C. Breedijk, J. van Duijnhoven,
C. Pellikaan, W. Op de Beeck
Energieweg 32
2964 LE, Groot Ammers
Tel. 0184-601558

De wond heeft tien dagen nodig om te helen maar na vijf dagen mag ze weer lekker op haar normale bodembedekking.

Bij de kliniek

Als u uw konijn komt brengen wordt bij de balie uw telefoonnummer nog even gecontroleerd. We geven namelijk een belletje als uw konijn weer lekker naar huis mag. Dit is meestal dezelfde ochtend/middag.

De castratie

Bij de operatie zijn altijd een chirurg en een anesthesist betrokken. Dit werkt veilig, snel en effectief.

Er wordt een snede van ongeveer vijf centimeter in de buik gemaakt. Dan worden de baarmoederhoornen waaraan de eierstokken vastzitten opgezocht. Met afbinddraad wordt de eierstok boven en onder afgebonden, zodat de eierstok weggeknipt kan worden. Als de baarmoeder er niet goed uitziet om wat voor reden dan ook dan wordt ook deze afgebonden en verwijderd.

De buikwand wordt eerst gesloten met atraumatisch materiaal. Dat wil zeggen dat de draad vastzit aan de naald waardoor je minder trauma toebrengt aan de weefsels. Het gebeurt met oplosbaar materiaal. Met een paar maanden is de draad opgelost. Met tien dagen zit de wond goed dicht.

De huid wordt vervolgens met knoophechtingen aan elkaar gezet. De knoopjes hebben een reden. Als je de huid doorlopend hecht, dat wil zeggen aan één stuk, en het konijn geeft een knauw dan kan de wond zo helemaal open roetsjen. Vandaar dus vele knoopjes wederom van oplosbaar materiaal. Of de huid wordt met nietjes gesloten.

Nazorg

Bij het ophalen vertellen wij nog dat uw konijn thuis meteen weer lekker mag eten en drinken en in een kooi gezet moet worden waar geen stro als bodembedekking in ligt, maar een handdoek.

Als uw konijn in een buitenhok zit dan wordt, afhankelijk van het jaargetijde waarin u uw konijn aanbiedt voor castratie, geadviseerd om hem de eerste dag/nacht na de ingreep binnen te houden. Bij mooi weer mag hij de volgende dag gewoon weer lekker naar buiten en bij slecht weer (koud/regen) mag hij wel weer in zijn buitenhok, maar leg dan in het beschutte deel extra veel stro neer.

Let er op dat uw konijn dezelfde dag weer gaat eten. Als uw konijn niet eet of keutelt de dag na de operatie dient u altijd contact op te nemen met de praktijk.